

香港常見含毒性成分的藥用植物

市民郊遊或遠足時，切勿擅自採摘藥用植物作為中藥煎煮服用或以之配藥。在服用任何中藥前，應先諮詢中醫師的意見。

其實，一些藥用植物的根、葉、果實、種子或其汁液都可能含有毒性，可透過皮膚接觸或進食，引致過敏或中毒反應。若懷疑或出現中毒徵狀，請立即求醫。

白花曼陀羅 *Datura metel* L.

	
中藥名稱及來源	洋金花，為茄科植物白花曼陀羅的花。
科屬	茄科曼陀羅屬
外形特徵	 草質半灌木狀。  單葉互生。葉卵形或廣卵形，頂端漸尖，基部不對稱圓形、截形或楔形。  花單生，漏斗狀，白色、黃色或淺紫色。  蒴果近球狀或扁球狀。
主要毒性成份	東莨菪鹼 (scopolamine)，莨菪鹼 (hyoscyamine) 及阿托品 (atropine)。
中毒症狀	口渴、皮膚潮紅、心跳及呼吸加快、頭暈、瞳孔散大、視物模糊，嚴重者可因呼吸麻痹死亡。

牛眼馬錢 *Strychnos angustiflora* Benth.

	
中藥名稱及來源	牛眼珠，為馬錢科牛眼馬錢的種子。
科屬	馬錢科馬錢屬
外形特徵	 木質藤本。  單葉對生，革質，卵形、橢圓形或近圓形，頂端急尖至鈍，基部鈍至圓。  三歧聚傘花序頂生，花冠白色，近基部和花冠管喉部被長柔毛。  漿果圓球狀，光滑，成熟時紅色或橙黃色。
主要毒性成份	番木鱉鹼 (strychnine)、馬錢子鹼 (brucine) 等。
中毒症狀	頸、面僵硬、肌肉強直性驚厥，嚴重者可死於呼吸麻痹或心力衰竭。

除牛眼馬錢外，香港另有兩種馬錢屬植物，包括傘花馬錢 *Strychnos umbellata* (Lour.) Merr. 和華馬錢 *Strychnos cathayensis* Merr.，均為有毒植物。

參考資料：《中國植物誌》、《中華本草》、《香港中草藥》、《Flora of Hong Kong》



衛生署

香港常見含毒性成分的藥用植物

蓖麻 *Ricinus communis* L.

	
中藥名稱及來源	蓖麻子，為大戟科植物蓖麻的成熟種子。
科屬	大戟科蓖麻屬
外形特徵	 粗壯草本或草質灌木。  葉掌狀中裂，邊緣有鋸齒。  雌雄同株異花，雌花生在花序上部，紅色；雄花生在花序下部，黃色。  蒴果卵球形或近球形，表面有軟刺。
主要毒性成份	蓖麻鹼 (ricinine) 和蓖麻毒蛋白 (ricin)。
中毒症狀	噁心、嘔吐、腹瀉、便血、肌肉痙攣或心力衰竭，嚴重可致休克及死亡。

鉤吻 (胡蔓藤、斷腸草) *Gelsemium elegans* (Gardn. et Champ.) Benth.

	
中藥名稱及來源	斷腸草，為馬錢科植物鉤吻的全株或其任何部分。
科屬	馬錢科鉤吻屬
外形特徵	 木質藤本。  單葉對生，卵形或卵狀披針形，先端漸尖，基部楔形或鈍圓。  三歧聚傘花序。花冠漏斗狀，黃色內有淡紅色斑點。  蒴果卵形。
主要毒性成份	鉤吻鹼(gelsemine) 等。
中毒症狀	眩暈、肌肉遲緩無力、吞嚥困難、複視、眼瞼下垂、瞳孔散大、噁心、嘔吐，嚴重者可因呼吸麻痹死亡。

除以上幾種外，**羊角拗、海芒果、野漆樹、夾竹桃、黃花夾竹桃、海芋**等都是香港常見含毒性成分的藥用植物，市民應盡量避免接觸、採摘及服用。

參考資料：《中國植物誌》、《中華本草》、《香港中草藥》、《Flora of Hong Kong》



衛生署