

提防中藥中毒

衛生署近日接獲一宗由自行處方中藥材後出現中毒的確診個案呈報。該病人因出現眩暈、頸部肌肉強硬、四肢麻痺等病癥，遂於本地公立醫院接受治療，現已出院。該病人的尿液樣本檢測到番木鱉鹼及馬錢子鹼。調查中發現該病人所服用的中藥材由其丈夫於本港數間不知名的藥店購買。此外，在中藥材樣本中鑒別出製馬錢子，而病人的處方顯示製馬錢子的用量遠超出臨床使用標準。是次中毒事件可能與過量服用製馬錢子的中藥材有關。

製馬錢子是一種中藥材，有止痛、消腫功能。服用過量的馬錢子可能會引致中毒，徵狀包括頭痛、頭暈、煩躁不安、呼吸急促、肌肉僵硬等，嚴重的中毒症狀包括痙攣、窒息，甚至死亡。

衛生署提醒市民，如需服用中藥，必須遵從合資格中醫師的指示；市民亦要避免自行配藥。此外，市民應光顧有良好信譽的藥商購買中藥，以策安全。

有關毒性中藥及煎煮中藥的健康資訊，請參閱以下網頁：

http://www.cmchk.org.hk/pdf/rp_pdh10_c.pdf

http://www.cmchk.org.hk/pdf/rp_pdh08_c.pdf

衛生署中醫藥事務部

2012 年 9 月