

## 提防中藥烏頭類生物鹼中毒

衛生署近日接獲一宗由醫院管理局呈報的有關烏頭類生物鹼中毒的確診個案。該個案病人曾獲深水埗一註冊中醫師配發中藥材製附子。病人接受治療後已康復出院。是次中毒個案懷疑與服用過量的製附子有關。現場調查並無發現該中醫師駐診的中藥材零售商內其他中藥材受到含烏頭類生物鹼的中藥材污染。而根據該中醫師提供的資料，獲其處方製附子的其他病人並無出現不良徵狀。

製附子含烏頭類生物鹼的毒性中藥材，有止痛功能，須經長時間的煎煮以降低毒性後方可服用。如不適當地使用，烏頭類生物鹼可引致口部及四肢麻痺、頭暈、噁心、嘔吐、腹瀉、脈搏微弱、呼吸困難等，嚴重者可導致死亡。

衛生署提醒中醫師在處方中藥時應參照有關的中藥材標準。市民亦必須遵從中醫師的指示煎煮及服用中藥材。市民如在服用中藥材後感到不適，應盡快求醫。

衛生署會將此個案轉介香港中醫藥管理委員會考慮對該中醫師作出紀律處分。

衛生署中醫藥事務部  
2013年8月1日