

提防中藥中毒

衛生署近日接獲由醫院管理局（醫管局）呈報一宗有關烏頭類生物鹼中毒的確診個案。事件涉及一名六十二歲病人，因服用了自行處方的中藥材製附子後，出現唇周和四肢麻痺、頭暈、噁心及胸口翳悶的徵狀，須入住公立醫院接受治療，其後已出院。病人的尿液樣本經醫管局化驗後，證實含有烏頭類生物鹼。是次中毒個案懷疑與病人自行處方和服用過量製附子，及煎煮方法不當有關。

製附子屬於《中醫藥條例》（第549章）附表2內中藥材，一般用於治療痛症。其含有烏頭類生物鹼，如不適當地使用，可引致唇周和四肢麻痺、頭暈、噁心、嘔吐、腹瀉、脈搏微弱及呼吸困難，嚴重可導致死亡。因此，製附子須經長時間的煎煮以降低毒性方可服用。

衛生署提醒市民不應妄自購買中藥，及應向有信譽和合資格的中醫師求診。如在服用中藥後感到不適，應盡快求醫。

市民可瀏覽衛生署中醫藥事務部網頁

(http://cmd.gov.hk/html/b5/health_info/pamphlet.html)，參閱更多有關安全使用中藥資訊。

衛生署中醫藥事務部

2015年8月24日