

提防中藥中毒

衛生署近日接獲由醫院管理局（醫管局）呈報一宗有關烏頭類生物鹼中毒的確診個案。事件涉及一名三十二歲病人，因服用家人為其煎煮含中藥材製附子的藥湯後，出現麻痺、暈眩、腹痛和腹瀉的徵狀，需入住公立醫院接受治療，其後出院。病人的尿液樣本經醫管局化驗後，證實含有烏頭類生物鹼。是次中毒個案懷疑與病人未經中醫師指導下自行服用中藥材及中藥材煎煮不足有關。

製附子屬於《中醫藥條例》（第549章）附表2內中藥材，一般用於治療痛症。其含有烏頭類生物鹼，如不適當地使用，可引致唇周和四肢麻痺、暈眩、噁心、嘔吐、腹瀉、脈搏微弱及呼吸困難，嚴重可導致死亡。因此，製附子須經長時間的煎煮以降低毒性方可服用。

衛生署提醒市民不應妄自購買中藥；如有不適，應先向中醫師求診才服用中藥。如在服藥後感到不適，應盡快求醫。

市民可瀏覽衛生署中醫藥事務部網頁 (http://cmd.gov.hk/html/b5/health_info/pamphlet.html)，參閱更多有關安全使用中藥資訊。

衛生署中醫藥事務部

2015年10月12日