

## 提防中藥中毒

衛生署接獲由醫院管理局（醫管局）呈報一宗有關烏頭類生物鹼中毒的確診個案。病人在沒有向中醫師求診的情況下，從內地一藥行購買藥材並自行煎煮服用。病人服用藥湯後短時間內出現口部麻痺、嘔吐和肚瀉的徵狀，其後入住公立醫院接受治療，現已出院。醫管局的化驗結果顯示，病人的尿液樣本和煎煮後的藥渣均含有烏頭類生物鹼。衛生署調查後確認未使用的藥材是製附子（白附片）。這次中毒個案懷疑與未經中醫師指導下自行服用製附子有關。

製附子屬於《中醫藥條例》（第 549 章）附表 2 中藥材，一般用於治療痛症，含有烏頭類生物鹼。如不適當地使用，烏頭類生物鹼可引致唇周和四肢麻痺、頭暈、噁心、嘔吐、腹瀉、脈搏微弱及呼吸困難，嚴重者可導致死亡。因此，製附子須經長時間的煎煮以降低毒性方可服用。

衛生署提醒市民不應妄自處方中藥；如有不適，應先向中醫師求診才服用中藥。如在服藥後感到不適，應盡快求醫。

市民可瀏覽衛生署中醫藥事務部網頁

([http://www.cmd.gov.hk/html/b5/health\\_info/pamphlet.html](http://www.cmd.gov.hk/html/b5/health_info/pamphlet.html))，參閱更多有關安全使用中藥資訊。

衛生署中醫藥事務部

2018 年 5 月 8 日