

提防中药乌头类生物碱中毒

卫生署近日接获一宗由医院管理局呈报的有关乌头类生物碱中毒的确诊个案。该个案病人曾获上水一注册中医师处方制附子。病人接受治疗后已康复出院。化验分析显示该病人尿液检测结果含有乌头类生物碱，是次中毒个案怀疑与服用过量的制附子有关。

制附子是含乌头类生物碱的中药材，可治疗寒证，须经长时间的煎煮以降低毒性后方可服用。如不适当地使用，乌头类生物碱可引致口部及四肢麻痹、头晕、恶心、呕吐、腹泻、脉搏微弱、呼吸困难等，严重者可导致死亡。

卫生署提醒中医师在处方中药时应参照有关的中药材标准。中医师在处方毒性中药材时要特别谨慎，用量、配伍及煎服方法等要根据临床情况及有所依据。市民亦必须遵从中医师的指示煎煮及服用中药材。市民如在服用中药材后感到不适，应尽快求医。

卫生署会将此个案转介香港中医药管理委员会跟进该中医师是否涉及不恰当执业。

有关安全使用含乌头类生物碱的中药材，可参阅卫生署网页 (http://www.cmd.gov.hk/html/b5/health_info/pamphlet/The_safe_use_of_Chinese_medicines_containing_aconitum_alkaloids.html)。

卫生署中医药事务部
2014年8月25日