

提防中药中毒

卫生署近日接获由医院管理局（医管局）呈报一宗有关乌头类生物碱中毒的确诊个案。肇事男病人在没有向中医师求诊的情况下，根据一来源不明的处方，自行于本地购买包括制附子的中药，并且未有先煎制附子便与其他药材一同煎煮。病人服药后出现舌头、额头及上肢麻痹的症状，其后入住公立医院接受治疗，现已出院。医管局的化验结果显示，病人的尿液含有乌头类生物碱。是次中毒个案怀疑与未经中医师指导下自行服用中药及煎煮不当有关。

制附子属于《中医药条例》（第 549 章）附表 2 中药材，一般用于治疗痛症，含有乌头类生物碱。如不适当地使用，乌头类生物碱可引致唇周和四肢麻痹、头晕、恶心、呕吐、腹泻、脉搏微弱及呼吸困难，严重者可导致死亡。制附子须先煎及经长时间的煎煮以降低毒性方可服用。

卫生署提醒市民不应妄自购买中药；市民在使用中药前，应先请教中医师。如在服药后感到不适，应尽快求医。

市民可浏览卫生署中医药规管办公室网页 (https://cmro.gov.hk/html/b5/health_info/pamphlet.html)，参阅更多有关安全使用中药信息。

卫生署中医药规管办公室
2020 年 11 月 5 日