

# 玫瑰花 與 月季花



## 來源

### 玫瑰花

為薔薇科植物

玫瑰 *Rosa rugosa* Thunb.  
的乾燥花蕾

### 月季花

為薔薇科植物

月季 *Rosa chinensis* Jacq.  
的乾燥花

## 概述

玫瑰花及月季花同為《中國藥典》(2020年版)收載的藥材，但只有月季花被收載於《中醫藥條例》附表2。常被稱為「玫瑰花」的一般泛指薔薇科薔薇屬植物外形相近的花，除可作藥用之外，亦可供食用及觀賞。事實上，入藥用的玫瑰花僅指*Rosa rugosa*一個品種，同屬的*Rosa chinensis*其實是月季花。根據《中國藥典》，玫瑰花歸肝、脾經，可行氣解鬱，和血，止痛；而月季花歸肝經，可活血調經，疏肝解鬱。兩者的外形雖然相似，但功能稍有不同，應區別使用。

# 玫瑰花與月季花

## 鑒別要點

### 玫瑰花之性狀特徵 🔍

- ◆ 卵圓形、類球形或不規則團狀



花瓣多數，紫紅色、淺紫紅色，基部有的呈黃棕色

萼片5枚，完整者呈披針形

花托壺形或半球形，常帶有短花梗



去除萼片及花瓣僅可見多數雄蕊，雌蕊不伸出於雄蕊群外

1 cm


5 mm

- ◆ 氣芳香濃郁

### 微性狀

A1：表面被稀疏的白色長柔毛，中央位置近無毛

A2：腺毛常見，多已折斷，柄呈長圓柱形，頭部扁球形




(花萼外表面)

500 μm

B1：雄蕊著生於花托口上

B2：雌蕊著生於花托筒內，頂端較雄蕊低很多

B3：花柱密被棕黃色絨毛



(花托縱切面)

2 mm




## 月季花之性狀特徵 🔍

### ◆ 卵圓形、類球形或不規則團狀



1 cm



花瓣多數，紫紅色、淺紫紅色、暗紫紅色，基部有的呈黃棕色

萼片5枚，完整者呈披針形

花托倒圓錐形或半長圓形，常帶有花梗

去除萼片及花瓣可見多數雌蕊，雌蕊伸出於雄蕊群外

雄蕊多數


5 mm

### ◆ 氣清香

## 微性狀

A1：表面無柔毛

A2：腺毛少見，主要位於邊緣，多已折斷，柄呈圓柱形，頭部扁球形




(花萼外表面)

500 μm

B1：雄蕊著生於花托口上

B2：雌蕊著生於花托筒內，頂端稍高於雄蕊

B3：花柱密被棕黃色絨毛











(花托縱切面)

2 mm

# 玫瑰花與月季花

## 玫瑰花與月季花之粉末顯微特徵比較



	玫瑰花	月季花
腺毛	 (頂面觀)  (側面觀) <p>少見，多已破碎，多細胞，頂面觀頭部呈類圓形，側面頭部呈圓形或扁圓形，柄部細胞排列成多列</p>	 (頂面觀)  (側面觀) <p>偶見或無，多已破碎，多細胞，頂面觀頭部呈類圓形，側面頭部呈圓形或扁圓形，柄部細胞排列成多列</p>
花瓣內表皮細胞	 (表面觀)  (側面觀) <p>表面觀外壁凸起；側面觀外壁的凸起多呈類三角形，頂端稍平</p>	 (表面觀)  (側面觀) <p>表面觀外壁凸起；側面觀外壁的凸起多呈半長圓形或半圓形，有的頂端稍尖</p>

50 μm

## 小結

玫瑰花與月季花的主要區別特徵：

		玫瑰花	月季花
性狀及微性狀	花托	壺形或半球形	倒圓錐形或長圓形
	雌蕊	不伸出於雄蕊群外	伸出於雄蕊群外
	花萼外表面	被稀疏的白色長柔毛，腺毛常見	無柔毛，腺毛少見
顯微	腺毛	少見	偶見或無
	花瓣內表皮細胞	外壁凸起多呈類三角形	外壁凸起多呈半長圓形或半圓形

更多資訊可參考 [香港中藥材標準網頁](#)：



月季花 — 香港中藥材標準 (第七冊)



衛生署

衛生署政府中藥檢測中心

查詢熱線：3188 8079

網址：www.cmro.gov.hk

本小冊子內的資訊，可供發布或複製作非商業用途，但必須註明有關資訊是由衛生署政府中藥檢測中心提供的。除非事先得到衛生署政府中藥檢測中心的書面授權，否則嚴禁複製、改編、分發、發布或提供本小冊子內的資訊作商業用途。