



對市民的建議

中藥材零售牌照



從持牌的中藥材 零售商購買藥材



可保證藥材來自信譽的供應商，減少購買到摻偽或不當加工的藥材之風險。



根據中醫師的 指示使用藥材



使用藥材前應先諮詢中醫師的意見，遵從指示煎藥，並按指定時間和份量服用。



不應購買過多劑數或將剩餘的藥材留待日後自行組方服用。

妥善貯存藥材



將藥材妥善貯存在陰涼乾燥、不易受潮受熱的地方，或按中醫師或中藥材零售商的指示貯存個別容易產生霉變的藥材。



切勿服用質量變異的藥材



如發現藥材有霉變跡象，便應停止服用及立即棄掉，因即使除去霉菌及藥材發霉的周圍部分，亦不保證能將看不見的黃曲霉毒素全部清除。



柏子仁（已霉變的）



蜂房（已霉變的）

藥材與黃曲霉毒素



本小冊子內的資訊，可供發布或複製作非商業用途，但必須註明有關資訊是由衛生署中醫藥規管辦公室提供的。除非事先得到衛生署中醫藥規管辦公室的書面授權，否則嚴禁複製、改編、分發、發布或提供本小冊子內的資訊作商業用途。

藥材與黃曲霉毒素

霉菌毒素泛指由某些真菌(霉菌)自然產生的有毒化合物，當中最常見及毒性最強的黃曲霉毒素，主要由黃曲霉菌屬(*Aspergillus*)的真菌產生。

無處不在的黃曲霉菌屬

這些真菌在大自然中無處不在，包括可在某些藥材上生長，而溫暖和潮濕的環境則有利於它們的繁殖。因此，在栽種或貯藏的過程中，處理不當的藥材均有可能受到黃曲霉毒素污染。

黃曲霉毒素難以完全消除

黃曲霉毒素無色、無味和無臭，亦能抵受高溫，因此藥材一旦受到其污染，要完全清除是近乎不可能的。

對人體健康的不良影響

在多種黃曲霉毒素當中，黃曲霉毒素B1、B2、G1和G2對人體的影響相對較大。

急性高劑量攝入黃曲霉毒素可能導致急性肝衰竭及橫紋肌溶解症。而長期接觸可影響多種器官系統，尤其是肝臟和腎臟。黃曲霉毒素亦可穿透胎盤進入胎兒體內，影響胎兒發育。

黃曲霉毒素可致癌

最值得關注的是，黃曲霉毒素已被世界衛生組織屬下的國際癌症研究機構(International Agency for Research on Cancer, IARC)列為第一類人類致癌物，跟煙草、酒精、石棉及電離輻射同屬一類。長期攝取黃曲霉毒素可引致肝癌，而其致癌性對於乙型肝炎病毒感染人士更為明顯。

對業界的建議

從有信譽的供應商採購藥材

- 中藥材批發商應從有信譽的供應商採購藥材，中藥材零售商亦應從持牌中藥材批發商採購藥材，以確保藥材的品質。
- 不要購入來歷不明，或品質存疑的藥材。
- 所有進口的藥材，必須符合供應商所在地的法定監管要求。如有疑問，應要求供應商提供有關的品質證明文件。

適當貯存及管理藥材

- 對於易發霉的藥材，應嚴格控制貯存倉庫的溫濕度，並採取遮光及密封的措施。
- 經過驗收的藥材，應立即存入倉庫，並應有適當的紀錄安排，以便在發放時能應用「先進先出」的原則。

定期進行外觀檢查

- 經過驗收的藥材，應立即存入倉庫，並應有適當的紀錄安排，以便在發放時能應用「先進先出」的原則。
- 在潮濕天氣或異常天氣應增加檢查頻次。

如發現藥材的質量變異，應停止供應及妥善處理。