

香港特別行政區政府  
衛生署  
中醫藥規管辦公室  
九龍觀塘巧明街100號  
LANDMARK EAST 友邦九龍大樓16樓



THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG  
SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION  
DEPARTMENT OF HEALTH  
CHINESE MEDICINE REGULATORY OFFICE  
16/F, AIA KOWLOON TOWER, LANDMARK EAST,  
100 HOW MING STREET,  
KWUN TONG, KOWLOON.

本署檔號 OUR REF.: DH CMRO/1-90/17  
來函檔號 YOUR REF.:  
電話 TEL.: (852) 2121 1888  
圖文傳真 FAX.: (852) 2123 9566

致各中醫師團體

執事中醫師：

### 內地武漢市肺炎病例群组個案的最新資訊

政府於一月二日召開跨部門會議，加強本港就湖北省武漢市出現的肺炎病例群组個案所採取的預防措施。繼本署於當日發出有關湖北省武漢市出現的肺炎病例群组個案的資料，現特函通知閣下有關的最新情況。

政府今天（一月四日）公布「對公共衛生有重要性的新型傳染病準備及應變計劃」，並同時啟動嚴重應變級別。

根據國家衛生健康委員會最新提供的資料，截至二〇二〇年一月三日上午八時，已發現44宗不明原因的病毒性肺炎病例，其中11宗病情嚴重，其餘則屬穩定。個案的病徵主要為發燒，少數病人出現呼吸困難。目前，所有病人均已接受隔離治療，並有121名密切接觸者正接受醫學觀察，密切接觸者的追蹤工作仍在進行中。流行病學調查顯示，部分病人是武漢「華南海鮮城」經營戶。目前為止，調查未發現明顯人傳人現象，亦未發現有醫護人員感染。病原的檢測及感染原因的調查工作仍在進行中，但已排除流感、禽流感、腺病毒感染等常見呼吸道疾病。

鑑於最新情況，衛生署衛生防護中心已擴大監測範圍。本署現提醒各中醫師，若你的病人出現發燒及急性呼吸道感染徵狀或肺炎病徵，並曾於病發前十四天內到訪武漢市（不論曾否到過街市或海鮮市場），便應盡快轉介病人到就近的公立醫院，作進一步診治。等候轉介期間，中醫師應指示該病人佩戴外科口罩及於

*我們要建設一個健康的香港  
並立志成為國際知名的公共衛生監管機構*

隔離區域等候。

為了提高中醫師對預防新型急性呼吸道傳染病爆發的認知，衛生署衛生防護中心已給中醫診所制訂相關的感染控制措施，有關詳情請參考附件一。

衛生防護中心與國家衛健委會繼續保持密切聯繫，密切監察武漢市肺炎群組個案的最新情況，並已就事件設立專題網頁 (<https://www.chp.gov.hk/tc/features/102465.html>)，以提供相關資訊、健康建議及每日公布符合加強監察的個案資料。

感謝各中醫師對傳染病預防和控制措施的支持。

衛生署署長

(黃惠英醫生



代行)

二零二零年一月四日

以上資料詳情可參閱以下新聞公報：

<https://www.info.gov.hk/gia/general/202001/02/P2020010200773.htm>

<https://www.info.gov.hk/gia/general/202001/03/P2020010300810.htm>

<https://www.info.gov.hk/gia/general/202001/04/P2020010400175.htm>



**衛生防護中心**  
Centre for Health Protection

**感染控制處**

**預防新型急性呼吸道傳染病爆發**

**給中醫診所的感染控制措施重點**

甲、本文主要簡述在中醫診所實施對新型傳染病感染控制措施重點

一、早準備

(a) 五個潔手時刻

員工要嚴遵五個潔手時刻：

1. 接觸病人前
2. 執行清潔/無菌程序前
3. 接觸體液後
4. 接觸病人後
5. 接觸病人周圍環境後

診所內應備有酒精搓手液或潔手設備，包括洗手設備、抹手紙及有蓋垃圾箱等。在診所內當眼處應張貼潔手海報，並備有相關單張，以提示病人及其陪伴人士應時刻保持手部衛生。

## **(b) 咳嗽禮儀**

在診所內當眼處應張貼咳嗽禮儀，以提示病人及其陪伴人士應時刻注意個人衛生。例如打噴嚏或咳嗽時應掩著口鼻，並保持手部衛生。如病人有發熱或有呼吸道感染徵狀應佩戴外科口罩。

## **(c) 環境整潔**

診所環境應保持整潔，每天應以清潔劑最少清潔一次，或有需要時用消毒劑，例如用1份含5.25%次氯酸鈉的家用漂白水與99份清水混和來進行消毒。經常觸摸的地方例如門柄、廁所，應加強清潔。如表面受到嘔吐物或其他體液污染，先用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，然後用1比49稀釋家用漂白水溶液消毒。此外，應定期檢查及維護樓宇排水管及隔氣彎管以防環境污染。

## **(d) 適當處理污染醫療物品、安全處理利器**

處理污染醫療物品則須遵從有關物品清潔、消毒與滅菌準則。

使用後的即棄針和利器，應直接棄置於有醫療廢物標籤的利器收集箱。詳情請參閱“建議的針灸感染控制指引-草稿”  
[https://www.chp.gov.hk/files/pdf/proposed\\_guidelines\\_on\\_infection\\_control\\_related\\_to\\_acupuncture\\_chi.pdf](https://www.chp.gov.hk/files/pdf/proposed_guidelines_on_infection_control_related_to_acupuncture_chi.pdf)

## **(e) 佩戴適當個人防護裝備**

根據接觸性質和風險評估佩戴適當的個人防護裝備。接觸每位病人後，員工應卸下個人防護裝備及潔手。

## **二、早發現**

### **(a) 盡快轉介懷疑個案**

經常留意本中心資訊。在新型急性呼吸道傳染病爆發時，先將病人分流，優先處理有發燒及急性呼吸道感染，或者肺炎徵狀的病人。如病人被評定為懷疑個案，應盡快轉介病人到就近的公立醫院，作進一步診治。

### 三、早隔離

#### (a) 指定隔離區域

安置懷疑個案於隔離區域等候轉介。如有可能，安排指定獨立房間作隔離用途，該房間只可存放必須物品。

#### (b) 保存記錄

保存病人病歷和職員輪值表，當發現懷疑個案時，以便衛生防護中心進行個案追蹤。

#### (c) 環境清潔及消毒

- (i) 負責清潔的員工應佩戴適當的個人防護裝備。
- (ii) 所有可能被污染的環境表面及安置懷疑個案的房間，應用1份含5.25%次氯酸鈉的家用漂白水與49份清水混和來進行消毒，待15至30分鐘後，再用清水沖洗及抹乾。
- (iii) 如地方被血液、分泌物、嘔吐物或排泄物污染，應使用1份含5.25%次氯酸鈉的家用漂白水與4份清水混和來進行消毒，待10分鐘後，再用清水沖洗及抹乾。

### 乙、最新資訊

有關預防對公共衛生有重要性的新型傳染病的最新情況，請瀏覽衛生防護中心專題網頁：

<https://www.chp.gov.hk/tc/healthprofessionals/submenu/index.html>

二零二零年一月

本文件的版權屬香港特別行政區衛生署衛生防護中心所有。本文件所載資料可隨意摘錄作教育、訓練或非商業用途，但請註明資料來自香港特別行政區衛生署衛生防護中心。除非事先獲得該中心的准許，否則任何人士不得使用、修改或複製本文件的任何部分作上述以外的用途。